

Karta ostrzeżeń dla pacjenta

Xerdoxo 2,5 mg
Xerdoxo 10 mg
Xerdoxo 15 mg
Xerdoxo 20 mg



(zaznaczyć pole odpowiadające przepisanej dawce)

XXXXX

- ◆ Kartę należy zawsze przechowywać przy sobie
- ◆ Kartę należy pokazywać przed leczeniem każdemu lekarzowi lub dentyście



Informacje dla personelu medycznego:

- ◆ Wskaźnik INR nie jest właściwy do pomiaru aktywności przeciwzakrzepowej leku Xerdoxo i z tego powodu INR nie może służyć do monitorowania leczenia Xerdoxo.

Co należy wiedzieć o leku Xerdoxo?

- ◆ Lek Xerdoxo rozrzedza krew, dzięki czemu zapobiega powstawaniu niebezpiecznych zakrzepów krwi.
- ◆ Lek Xerdoxo należy stosować dokładnie tak, jak zalecił lekarz. W celu

zapewnienia najlepszej ochrony przed powstawaniem zakrzepów krwi, **nigdy nie należy pomijać dawki leku.**

- ◆ Nie wolno przerywać przyjmowania leku Xerdoxo bez uprzedniej konsultacji z lekarzem, ponieważ ryzyko powstania zakrzepów krwi może się zwiększyć.
- ◆ Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Xerdoxo należy poinformować lekarza o wszystkich innych lekach, które są przyjmowane przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

- ◆ Należy poinformować personel medyczny o przyjmowaniu leku Xerdoxo przed każdą operacją lub zabiegiem inwazyjnym.

Kiedy należy zasięgnąć porady lekarza?

Podczas przyjmowania leków rozrzedzających krew, takich jak Xerdoxo, ważne jest, aby być świadomym wystąpienia możliwych działań niepożądanych. Krwawienie jest najczęstszym działaniem niepożądanym. Nie wolno rozpoczynać przyjmowania leku Xerdoxo bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem, jeśli pacjent wie, że jest w grupie zwiększonego ryzyka wystąpienia krwawienia. Należy natychmiast powiadomić lekarza,

jeśli wystąpią jakiegokolwiek objawy przedmiotowe lub podmiotowe krwawienia, takie jak:

- ◆ ból
- ◆ obrzęk lub dyskomfort
- ◆ ból głowy, zawroty głowy lub osłabienie
- ◆ nadmierna skłonność do powstawania siniaków, krwawienie z nosa, krwawienie z dziąseł oraz ze skaleczeń, które nie ustają przez długi czas
- ◆ krwawienie miesiączkowe lub krwawienie z pochwy o większym nasileniu niż normalnie

- ◆ krew w moczu, która może dać różowe lub brązowe zabarwienie moczu, czerwone lub czarne zabarwienie stolca



- ◆ odkrztuszanie krwi lub wymiotowanie krwią lub treścią przypominającą fusy od kawy

Jak przyjmować lek Xerdoxo?

- ♦ W celu zapewnienia najlepszej ochrony lek Xerdoxo
- 2,5 mg można przyjmować z jedzeniem lub bez jedzenia
- 10 mg można przyjmować z jedzeniem lub bez jedzenia
- 15 mg trzeba przyjmować z posiłkiem
- 20 mg trzeba przyjmować z posiłkiem

Jestem poddawany(-a) leczeniu przeciwzakrzepowemu lekiem Xerdoxo (rywaroksaban).

Imię i nazwisko:

Adres:

Data urodzenia:

Waga:

Inne leki / choroby:

W nagłym przypadku należy powiadomić:

Imię i nazwisko lekarza:

Pieczętka lekarza:

Telefon lekarza:

Należy również powiadomić:

Imię i nazwisko:

Numer telefonu:

Stopień pokrewieństwa: